

問題 B

- 問 1. 誤嚥性肺炎について誤っているものを1つ選びなさい
1. 誤嚥性肺炎は摂食・嚥下障害がないと起こらない
 2. 誤嚥性肺炎が起こる理由として口腔・咽頭内容物による誤嚥がある
 3. 誤嚥性肺炎が起こる理由として胃逆流物による誤嚥がある
 4. 70歳以上の肺炎の多くが誤嚥性肺炎である
 5. 誤嚥したら必ず誤嚥性肺炎になるとは限らない
- 問 2. 摂食・嚥下に最も影響の少ない徴候を選びなさい
1. 運動失語
 2. 観念失行
 3. 半側空間無視
 4. 肢節運動失行
 5. 仮性球麻痺
- 問 3. 脳卒中急性期の嚥下障害について正しいものを選びなさい
1. 初回発作であっても認められる
 2. 反復唾液嚥下テストの結果によって飲水を許可する
 3. 飲水には吸飲み容器を用いる
 4. 食物は定温のものが適している
 5. 頸部伸展位をとらせる
- 問 4. 嚥下障害が見られないのはどれか選びなさい
1. 軟口蓋麻痺
 2. 重症筋無力症
 3. 下咽頭ガン
 4. 食道異物
 5. 地図状舌
- 問 5. 脳卒中急性期の摂食・嚥下に最も影響の少ないものを選びなさい
1. 意識障害
 2. 肺炎
 3. 認知機能障害
 4. 歩行障害
 5. 右片麻痺

問題 B

- 問 6. 最初に頻尿や便秘などの自律神経障害が出現し、次第に軽い物忘れ・幻視・被害妄想、進行すると歩行障害・嚥下障害などが出現する疾患は下記のどれか？
1. 筋萎縮性側索硬化症
 2. アルツハイマー型認知症
 3. レビー小体型認知症
 4. 多系統萎縮症
 5. 前頭側頭葉変性症
- 問 7. これまでの研究で、アルツハイマー型認知症の発症を促進する病態が知られているが、現時点では関係性が低いと思われるものはどれか？
1. 脳卒中
 2. 糖尿病
 3. 肥満
 4. 胃がん
 5. 高血圧
- 問 8. 正しい組み合わせを選びなさい
- a. 反回神経障害……嗄声
 - b. 舌下神経障害……舌偏位
 - c. 舌咽神経障害……舌萎縮
 - d. 三叉神経障害……味覚脱失
 - e. 顔面神経障害……閉眼困難
1. a, b, c
 2. a, b, e
 3. a, d, e
 4. b, c, d
 5. c, d, e
- 問 9. 組み合わせとして正しくないものを選びなさい
1. 延髄梗塞 — 球麻痺
 2. 大脳基底核 — 運動失調
 3. 内包 — 片麻痺
 4. 橋梗塞 — 交代性片麻痺
 5. 多発性脳梗塞 — 仮性球麻痺

問題 B

問 10. アルツハイマー型認知症で、最も高度になってから出てくる症状を選びなさい

1. 物忘れ
2. 徘徊
3. 嚥下障害
4. 盗られ妄想
5. 嗅覚識別能低下

問 11. 前頭前野/眼窩面の機能が低下した時の症状で頻度が一番低いのはどれか？

1. 意味性失語
2. 暴言・暴力
3. 過食
4. 万引き
5. 憐憫(レンビン)の情の欠如

問 12. 高齢者の脱水の症状として、誤っているものを選びなさい

1. 尿量・唾液分泌量の減少
2. 記憶障害・せん妄
3. 食欲低下
4. 微熱
5. 血症ナトリウムイオン濃度の低下